





CLE DE DETERMINATION DES GRAINS DE POLLEN

GRAINS ISOLÉS	Sans sillons Sans pores	Sans ballonnets	Peuplier (<i>Populus</i>)  10 μm
		Avec Ballonnets	Pin (<i>Pinus</i>)  Ballonnets 80 μm
	Sans sillons Avec pores	1 pore	Poaceae – Graminées  Pore Dimensions (d) : d < 40 μm → graminées sauvages d > 40 μm → graminées cultivées
		3 pores	Bouleau (<i>Betula</i>) Noisetier (<i>Corylus</i>)  Pore 20 μm 
		Plus de 3 pores	Aulne (<i>Alnus</i>) Charme (<i>Carpinus</i>)  20 μm  30 μm
	Avec sillons Sans pores	3 sillons	Chêne (<i>Quercus</i>) Erable (<i>Acer</i>)  Sillon 30 μm 
	Avec sillons Avec pores	3 sillons 3 pores	Tilleul (<i>Tilia sp.</i>)  20 μm
		Plus de 3 spores et 3 sillons	Pissenlit (<i>Taraxacum sp.</i>)  30 μm
GRAINS MULTIPLES	4 grains		Bruyère (<i>Erica</i>)  25 μm
	Plus de 4 grains		Acacia (<i>Acacia</i>)  30 μm